

MAHALAUKUN TÄHYSTYS (GASTROSKOPIA)

Mahantähystyksellä tutkitaan ruokatorven, mahalaukun ja ohutsuolen sairauksia. Tutkimus tehdään taipuisalla tähystimellä, joka viedään suun kautta mahaan ja edelleen ohutsuolen alkuosaan. Tutkimus kestää noin 10 minuuttia. Sen yhteydessä otetaan yleensä pieniä näytteitä. Näytepalojen ottaminen ei aiheuta kipua. Nielemisen helpottamiseksi nielunne voidaan puuduttaa.

TUTKIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

- Teidän tulee olla syömättä ja juomatta kuusi (6) tuntia ennen tutkimusta. Voitte kuitenkin ottaa aamulääkkeenne normaalisti vähintään kaksi (2) tuntia ennen tutkimusta.
- Mikäli tutkimus tehdään Teille ensimmäistä kertaa, tai olette tulossa kontrollitähystykseen ja olette edeltävästi saanut häätöhoidon helikobakteeri-infektioon, tulee Teidän tauottaa niin sanotut protonipumpun estäjät (Lansoprazol®, Zolt®, Lanzo®, Pantopratsol®, Somac®, Omeprazol®, Losec®, Pariet®, Nexium®) viikon ajaksi.
- Jos Teillä on käytössänne Marevan® tai Plavix® lääkehoito ottakaa noin viikkoa ennen tähystystä yhteyttä Mikkelin keskussairaalan endoskopiayksikköön; puh. 015-351 2316, arkisin klo 9:00 - 11:00.

TUTKIMUKSEN JÄLKEEN

- Kun puudutus on hävinnyt nielusta, saatte syödä ja juoda normaalisti. Puudutus häviää n. 30 minuutissa.