

## **TIEDOTE OPPILAAN VANHEMMILLE**

Lapsenne luokalla on todettu päätäitä. Tartunnan tapahduttua voi kulua joitakin viikkoja, ennen kuin selvät merkit päätäistä (saivareet) ovat nähtävissä. Saivareet ovat päätäin laskemia vaaleita munia pieninä helmimäisinä palloina hiusten tyviosassa.

Täit ja saivareet leviävät yleensä lapsesta toiseen päähineiden sekä hiuspantojen ja harjojen sekä muiden hiustenhoitovälineiden kautta. Nykyisin täitartunnalla ja huonolla hiushygienialla ei katsota olevan yhteyttä. Täitartunta ei ole häpeä, ja se on hoidettavissa. Kotieläimet eivät levitä täitartuntaa.

Täit ovat pieniä, 1-2 mm pitkiä ja lähes huomaamattomia. Juuri munasta kuoriutunut täi on pistemäinen, melkein läpinäkyvä ja tarkemmin katsottuna liikkuva. Vanhempana täi on ruskean harmaa. Täi elää n. kuukauden ja tarvitsee ravinnokseen ihmisen lämpöä ja verta. Naaraan munittua kehittyä saivareesta täi n. kymmenessä vuorokaudessa. Ihmiskehon ulkopuolella täi kuolee vuorokaudessa.

Päätäi aiheuttaa kutinaa hiuspohjan alueelle, etenkin niskaan. Puremakohtiin kehittyä punertavia näppyjä, jotka helposti raavitaan rikki. Tämän seurauksena voi päänahkaan tulla bakteerien aiheuttamia ihoinfektioita. Varsinaisia tartuntatauteja päätäi ei Suomessa levitä.

Koska päätäi on vaikea huomata, seurakaa lapsenne hiuksia ja päänahkaa muutaman viikon ajan. Hiukset kammataan päivittäin jakausittain tarpeeksi tiheällä kammalla. Jos löydätte merkkejä täitartunnasta, toimikaa seuraavasti:

- täiden hävittämiseen on saatavana erilaisia valmisteita apteekista ilman lääkärin määräystä, kannattaa noudattaa apteekin ja pakkauksen ohjeita käytön suhteen
- jos olette epävarmoja asian suhteen, voitte ottaa yhteyttä lapsen koulun terveydenhoitajaan lisäohjeiden saamiseksi, hiusten tarkastaminen kuuluu kuitenkin lapsen perheelle, koulun terveydenhoitajalla ei ole mahdollisuutta seurata koko ryhmän tai luokan hiuksia päivittäin
- käsittelyn jälkeen vaihdetaan puhtaat liinavaatteet sekä pestään päähineet, kammat ja hiusharjat huolellisesti
- **koko perhe hoidetaan, ensimmäinen hoito kaikille ja noin viikon kuluttua uusitaan hoito niille joilla tartunta todettiin**
- hoidon jälkeen lapsi voi mennä kouluun seuraavana päivänä

**Turhat hoidot voivat lisätä vastustuskykyisten täikantojen syntyä, siksi hoidetaan vain todetut täitartunnat!**