

Asiakas- ja potilasturvallisuus ESSOTEssa

[LAATUKYSYMYKSIÄ](#)




Korvattavien potilovahinkojen lukumäärät

Valitse rivimuuttuja

HOITOLAITOS(VAH.PAIKKA)
PERUSSAIRAUS(B)
TOIMENPIDE(B)

RATKAISUVUOSI ▲	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valittu rivi ▲	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä
Total	41	40	46	41	37	49	32	45	52	49	30	39	52	51	44
10 SISÄTAUDIT	1	2	.	2	.	2	1	2	2	2	1	2	4	2	.
11 ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO	.	1	1	.	.	1	1
15 AKUUTTILÄÄKETIEDE	4	3	.
20 KIRURGIA	28	20	29	25	17	37	21	29	20	29	11	15	30	26	18
30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET	.	1	3	.	4	1	.	2	4	1	.	2	3	3	4
40 LASTENTAUDIT	1	.	1	.	1	.	2	1	.	.	.
50 SILMÄTAUDIT	1	.	.	2	.	.	1	2	3	.	2	1	1	.	2
55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT	.	1	1	.	.	1	.	1	1
58 HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIRAUDET	.	2	3	2	6	1	3	1	4	4	4	4	.	6	3
60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT	.	1
65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHO...	1	.	2	1	.	.	1
70 PSYKIATRIA	1	.	.	1
75 LASTENPSYKIATRIA	2	.	.	.
77 NEUROLOGIA	.	1	2	2	.	.	1	.	.



Painehaavaselvitys vuodeosastoilla vv. 2016-2018

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Jarmo J Koski
22.1.2019


Painehaavojen esiintyminen



- Kansainvälisissä tutkimuksissa on arvioitu, että jopa noin viidesosalle sairaalahoitossa olevista potilaista syntyy hoidon aikana painehaava (Strausberg ym. 2010, Bredesen ym. 2015, Shafipour ym. 2016, VanGilder ym. 2017).
- Suomessa noin 5-15 % kotihoidossa, hoitolaitoksissa ja sairaaloissa olevista potilaista saa painehaavan (Soppi 2010).
- Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että painehaava esiintyi 9 % hoidossa olevista potilaista. Painehaavan syntyyn yhteydessä todettiin olevan sekä potilaan korkea ikä, että pitkä hoitajakso. (Koivunen ym. 2018.)

PAINEHAAVARISKIN ARVIOINTI SEKÄ PAINEHAAVOJEN ESIINTYMINEN, ILMAANTUMINEN
JA NIIDEN EHKÄISY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA – Hoitotyön konsortiohanke

Painehaavojen luokitus



- 1) Ehjän ihon punoitus, joka ei häviä asentoa vaihdettaessa. Ihon värin muutos, kipu, kuumotus, turvotus tai ihonalaisen kudoksen kovettuminen ovat merkkejä ensimmäisen asteen painehaavasta.
- 2) Ihon tasossa oleva pinnallinen vaurio, joka ulottuu epidermikseen ja dermikseen saakka. Haava on pinnallinen, punainen, rikkoutunut, rakkulainen tai nirhautunut.
- 3) Koko ihon läpäisevä vaurio, johon liittyy ihonalaisen kudoksen negroosi. Vaurio voi ulottua lihaksen peitinkalvoon mutta ei sen läpi.
- 4) Ihon alaiseen rasvakudokseen ulottuva koko ihon ja ihonalaisen kudoksen vaurio. Lihakseen, luuhun ja/tai niveleeseen ulottuvaa. Haavassa on usein taskumaisia kohtia ja onkaloita.

Painehaavaprevalenssi 5.10.2016 (vuodepaikat 146)



<u>Mikkelin keskussairaala</u>						
Sijainti	LK1	LK2	LK3	LK4	Luokittelematon	
Korvalehti						
Lapaluu						
Olkapää						
Kyynärpää						
Ristiselkä					1	1
Lonkkaluu	1	1				2
Polvi	1	1				2
Kehräsluu	1					1
Kantapää	2					2
Muu *	1	2			2	5
Yhteensä	6	4			3	13

Painehaavaprevalenssi 11.10.2017 (vuodepaikat 161)

Sijainti	LK1	LK2	LK3	LK4	Luokittelematon	Yhteensä
Korvalehti		2				2
Lapaluu	1					1
Olkapää						
Kyynärpää						
Ristiselkä	4	1	2	1		8
Lonkkaluu						
Polvi						
Kehräsluu						
Kantapää	5	2	1			8
Muu *	4					4
Yhteensä	14	5	3	1	0	23

Painehaavaprevalenssi 15.11.2019 (vuodepaikat 161)

Sijainti	LK1	LK2	LK3	LK4	Luokittelematon	Yhteensä
Korvalehti						
Lapaluu						
Olkapää						
Kyynärpää						
Ristiselkä	6	2	2			10
Lonkkaluu		2				2
Polvi	1	1				2
Kehräsluu	1					1
Kantapää	2	3	2			7
Muu *						
Yhteensä						22